



AVERTISSEMENTS AGRICOLES TELEIMPRIMES

003 00089 0297A 00 241017 04003

CNEPS
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DEPARTEMENT DES PERIODIQUES
56 RUE DE RICHELIEU

75084 PARIS CEDEX 02

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
280, RUE DE FOUGERES BP 67128 35067 RENNES CEDEX

EDITION CULTURES LEGUMIERES

BULLETIN N°199

RENNES LE 24 OCTOBRE 1990

SITUATION DANS LE NORD FINISTERE ARTICHAUT

Poursuite des vols de pucerons verts et noirs. La colonisation des parcelles continue lentement. Apparition des premiers adultes d'apions dans de nombreuses parcelles.

Dans les parcelles déjà traitées contre les pucerons avec un produit spécifique contre ces insectes, réintervenir avec un insecticide efficace sur apions: LANNATE ou pyrèthrinioïde.

Dans les parcelles non traitées contre les pucerons, intervenir avec un mélange d'insecticides efficaces à la fois sur pucerons et apions: PRIMOR + pyrèthrinioïde ou CRONETON + pyrèthrinioïde.

En ce qui concerne les températures d'utilisation de PRIMOR et les possibilités de mélange avec CRONETON, consultez la rubrique "choux" ci-dessous.

CHOUX

Sur choux-fleurs, choux pommés et choux de Bruxelles, une recrudescence des attaques de noctuelles est notée avec présence importante de jeunes larves. Les attaques de pucerons cendrés sont stabilisées par de nombreux auxiliaires mais restent globalement à un niveau élevé, notamment dans les parcelles mal protégées. Les piérides occasionnent encore localement des dégâts importants.

Dans les parcelles correctement protégées, maintenez la surveillance, notamment vis à vis des noctuelles.

758

Dans les parcelles où des dégâts notables de pucerons et/ou noctuelles et/ou piérides sont notés, intervenez rapidement. Privilégiez le traitement de fin d'après-midi avec un fort volume de bouillie par ha pour limiter les attaques de noctuelles.

Les traitements insecticides efficaces, utilisables sur choux, contre les pucerons cendrés, les noctuelles et les piérides sont:

- le diméthoate associé à une pyréthrianoïde de synthèse
- le KARATE K
- le PIRIMOR associé à une pyréthrianoïde de synthèse
- le DECIS B qui peut s'utiliser dans le cas de plantations d'artichaut en intercalaire ou de récolte prochaine de chou-fleur d'automne. Un délai d'intervention de 3 jours avant récolte est à respecter.
- le CRONETON associé à une pyréthrianoïde de synthèse. Le mélange est possible sans restriction avec BAYTHROID. Pour les autres pyréthrianoïdes de synthèse, vérifier au préalable la compatibilité physique avec CRONETON en faisant un test dans un seau.

Le PIRIMOR et le KARATE K doivent s'employer par température supérieure ou égale à 15°C, l'après-midi de préférence.

En ce qui concerne les cultures intercalaires de choux dans les artichauts, respectez les délais d'emploi des produits avant la récolte des artichauts.

CAROTTE

L'oïdium est en régression mais il subsiste encore dans les parcelles mal protégées. L'alternaria fait son apparition. De plus, les conditions actuelles lui sont favorables.

Réalisez un traitement contre l'alternaria.

Utilisez ROVRAL ou KIDAN.

POIREAU

Des foyers de rouille du poireau sont constatées dans certaines parcelles. Les attaques d'alternaria progressent.

Maintenez la protection contre la rouille.

L'ANTRACOL bénéficie d'une autorisation de vente. BAYTAN, ETENDARD, ANVIL et TILT SP sont efficaces.

Réalisez un traitement contre l'alternaria.

Utilisez le chlorothalonil à 1500 g de matière active par ha.